

Katalog nasion

KUKURYDZA

2022



caussadesemencespro

SPIS TREŚCI



ZIARNO



GRYS



KISZONKA



BIOETANOL



BIOGAZ

ES SCORPION	 	3
CS WANTI		4
DENSITI CS	  	5
ES MIDGARD	 	6
RIANNI CS	  	7
CS SOREMI	  	8
ARBORI CS		9
DELICI CS		10
TOUTATI CS	 	11
AMISTI CS	 	12
BAOBI CS	 	13
CS KISSMI	 	14
MONLERI CS	 	15
HERKULI CS	   	16
VOYAGER		17
POESI CS	 	18
ES WINWAY	 	19
MARTELI CS	 	20
OSTINATI CS		21





KISZONKA



ZIARNO


Charakterystyka

- tolerancja na suszę
- zdrowotność
- wczesny wigor


REJESTRACJA Polska 2017

TYP SC mieszańców pojedynczy


MORFOLOGIA KOLBY



DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU




Plonowanie



Plon (% wzorca /dt/ha) ogólny suchej masy w lokalizacjach doświadczalnych rejestrowych COBORU 2015-2016 r.



Cechy agronomiczne





Charakterystyka



szybkie dosychanie

REJESTRACJA Litwa 2020, Niemcy, Włochy 2021

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,5




ziaren/rząd
średnio
32,1



typ ziarna
FLINT/DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa wczesna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2020-2021 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: <i>Fusarium moniliforme</i>		
Kolba: <i>Fusarium graminearum</i>		



ZIARNO



GRYS



KISZONKA

Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA Włochy 2019

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY




rzędów
średnio
15,5



ziaren/rząd
średnio
35,0



typ ziarna
FLINT/DENT



DOPASOWANIE

 bardzo dobre

dobro

średnie

niedopasowana



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/oporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		





ZIARNO



BIOFTANOI

Charakterystyka



szybkie dosychanie



zdrowotność

REJESTRACJA Litwa 2021, spodziewana – Polska 2022

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
16,2




ziaren/rząd
średnio
26,7



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU




DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie

NOWOŚĆ!



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa wczesna. Doświadczenia rejestrowe COBORU2020 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



ZIARNO



BIOETANOL



KISZONKA

Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA Holandia 2013, Niemcy, Włochy 2014

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,3




ziaren/rząd
średnio
26,0



typ ziarna
FLINT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa wczesna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2016 r.

Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA Włochy 2021

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,3




ziaren/rząd
średnio
30,6



typ ziarna
FLINT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Cechy agronomiczne

średni/średnio podatny

mocny/odporny

Wczesny wigor



Tolerancja
na sulfonilomoczniki



Stay green



Wylęganie korzeniowe



Wyleganie przed zbiorem



Głównia kukurydzy



Kolba: *Fusarium moniliforme*




Kolba: *Fusarium graminearum*



Plonowanie

NOWOŚĆ!



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa wczesna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2020-2021 r.





Charakterystyka



szybkie dosychanie



zdrowotność

REJESTRACJA Słowacja 2019

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
16,3




ziaren/rząd
średnio
27,8



typ ziarna
DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

bardzo dobre

obre

średnie

niedopasowana

Cechy agronomiczne

šredni/šrednio podatny

mocny/odporny

Wczesny wigor



Tolerancja na sulfonilomoczniki



Stay green



Wylęganie korzeniowe



Wylęganie przed zbiorem



Głównia kukurydzy




Kolba: *Fusarium moniliforme*



Kolba: *Fusarium graminearum*



Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa średniowczesna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2020-2021 r.





Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA Polska 2020

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
16,0




ziaren/rząd
średnio
32,2



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU




DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		

Plonowanie



Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha).
Grupa średniowczesna. Doświadczenia porejestrowe
COBORU/PZPK 2020 r.





ZIARNO



BIOFTANOI

Charakterystyka



szybkie dosychanie

REJESTRACJA Włochy 2014

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,5




ziaren/rząd
średnio
29,3



typ ziarna
DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

-  bardzo dobre
-  dobre
-  średnie
-  niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa średniowczesna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU / PZPK 2016 r.

Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: <i>Fusarium moniliforme</i>		
Kolba: <i>Fusarium graminearum</i>		





KISZONKA



ZIARNO

Charakterystyka



wczesny wigor

REJESTRACJA Włochy 2019, Czechy 2020

TYP TC mieszaniec trójliniowy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,7




ziaren/rząd
średnio
31,2



typ ziarna
FLINT/DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (% wzorca / dt/ha). Grupa średniowczesna. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2020-2021 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



Charakterystyka



zdrowotność



wczesny wigor

REJESTRACJA Słowacja 2018

TYP TC mieszaniec trójliniowy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,3




ziaren/rząd
średnio
29,8



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU




DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/oporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		

Plonowanie



Plon ogólny świeżej masy w rejonach (% wzorca / dt/ha).
Grupa średniopóźna. Doświadczenia porejestrowe
COBORU 2020 r.





KISZONKA



BIOGAZ

Charakterystyka



zdrowotność



wczesny vigor

REJESTRACJA Włochy 2020

TYP TC mieszaniec trójliniowy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,2




ziaren/rząd
średnio
26,4



typ ziarna
FLINT/DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon ogólny świeżej masy w lokalizacjach (% wzorca / dt/ha).
Grupa średniopóźna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2020-2021 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny vigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



ZIARNO



BIOETANOL



KISZONKA



BIOGAZ

Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA Włochy 2010

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,2




ziaren/rząd
średnio
38,4



typ ziarna
FLINT/DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

-  bardzo dobre
-  dobre
-  średnie
-  niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w województwach.
Grupa średniopóźna. Doświadczenia porejestrowe
COBORU 2014 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: <i>Fusarium moniliforme</i>		
Kolba: <i>Fusarium graminearum</i>		

Charakterystyka



zdrowotność

REJESTRACJA spodziewana – Włochy 2022

TYP TC mieszaniec trójliniowy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,0




ziaren/rząd
średnio
25,8



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

 bardzo dobre

 dobre

● średnie

 niedopasowana

Cechy agronomiczne

šredni/šrednio podatny

mocny/odporny

Wczesny wigor



Tolerancja na sulfonilomoczniki



Stay green



Wylęganie korzeniowe



Wyleganie przed zbiorem



Głównia kukurydzy



Kolba: *Fusarium moniliforme*



Kolba: *Fusarium graminearum*





KISZONKA



BIOGAZ

Charakterystyka



zdrowotność



wczesny wigor

REJESTRACJA Niemcy, Włochy 2017, Czechy 2018

TYP TC mieszaniec trójliniowy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,8




ziaren/rząd
średnio
33,1



typ ziarna
FLINT/DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach. Grupa średniopóźna. Doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2018 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



Charakterystyka



szybkie dosychanie



zdrowotność

REJESTRACJA Polska 2021

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
14,9




ziaren/rząd
średnio
28,5



typ ziarna
DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa średniopóźna. Doświadczenia porejestrowe
COBORU 2021 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



Charakterystyka



szybkie dosychanie

REJESTRACJA Włochy 2012

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
15,0




ziaren/rząd
średnio
33,0



typ ziarna
DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa średniopóźna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2012 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: Fusarium moniliforme		
Kolba: Fusarium graminearum		



Charakterystyka



szybkie dosychanie

REJESTRACJA Węgry, Słowacja 2018

TYP SC mieszaniec pojedynczy

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów
średnio
16,7




ziaren/rząd
średnio
27,2



typ ziarna
DENT


DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- niedopasowana

Plonowanie



Plon (dt/ha) / wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.
Grupa średniopóźna. Doświadczenia rozpoznawcze
COBORU/PZPK 2020 r.



Cechy agronomiczne

	średni/średnio podatny	mocny/odporny
Wczesny wigor		
Tolerancja na sulfonilomoczniki		
Stay green		
Wyleganie korzeniowe		
Wyleganie przed zbiorem		
Głównia kukurydzy		
Kolba: <i>Fusarium moniliforme</i>		
Kolba: <i>Fusarium graminearum</i>		

INDEKS ODMIAN



ZIARNO



GRYS



KISZONKA



BIOETANOL



BIOGAZ

NAZWA	STRONA	FAO	REJESTRACJA	TYP MIESZAŃCA	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA	DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU		
							SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
AMISTI CS	12	250-260	Włochy 2019, Czechy 2020	TC	 	FLINT/DENT	80 000	85 000	90 000
ARBORI CS	9	240	Słowacja 2019	SC		DENT	75 000	80 000	85 000
BAOBI CS	13	250-260	Słowacja 2018	TC	 	FLINT/DENT	75 000	85 000	95 000
DELICI CS	10	240	Polska 2020	SC		FLINT/DENT	80 000	85 000	90 000
DENSITI CS	5	230-240	Polska 2020	SC	  	FLINT/DENT	80 000	80 000	80 000
HERKULI CS	16	260-270	Włochy 2010	SC	   	FLINT/DENT	70 000	75 000	85 000
CS KISSMI	14	250-260	Włochy 2020	TC	 	FLINT/DENT	75 000	82 000	90 000
MARTELI CS	19	280	Włochy 2012	SC	 	DENT	75 000	80 000	82 000
ES MIDGARD	6	230-240	Litwa 2021	SC	 	FLINT/DENT	70 000	75 000	80 000
MONLERI CS	15	250-260	Włochy 2015	TC	 	FLINT/DENT	75 000	85 000	95 000
OSTINATI CS	21	280	Węgry, Słowacja 2018	SC		DENT	75 000	80 000	85 000
POESI CS	17	270	Niemcy, Włochy 2017, Czechy 2018	TC	 	FLINT/DENT	75 000	85 000	95 000
RIANNI CS	7	230-240	Holandia 2013, Niemcy, Włochy 2014	SC	  	FLINT	80 000	85 000	90 000
ES SCORPION	3	210-220	Polska 2017	SC	 	FLINT/DENT	80 000	85 000	90 000
CS SOREMI	8	230-240	Włochy 2021	SC	  	FLINT	80 000	85 000	90 000
TOUTATI CS	11	240-250	Włochy 2014	SC	 	DENT	80 000	85 000	90 000
CS WANTI	4	230	Litwa 2020, Niemcy, Włochy 2021	SC		FLINT/DENT	75 000	85 000	95 000
VOYAGER	17	260	spodziewana - Włochy 2022	TC		FLINT/DENT	80 000	85 000	90 000
ES WINWAY	18	270	Polska 2021	SC	 	DENT	70 000	75 000	75 000



caussade-nasiona.pl



PRZEDSTAWICIELE:

1	Sławomir Markiewicz	tel.: +48 661 999 571	slawomir.markiewicz@caussadesemencespro.com
2	Kamil Tyszk	tel.: +48 669 333 050	kamil.tyszk@caussadesemencespro.com
3	Jadwiga Aleksandrowicz	tel.: +48 602 414 500	jadwiga.aleksandrowicz@caussadesemencespro.com
4	Tomasz Kluziak	tel.: +48 885 999 020	tomasz.kluziak@caussadesemencespro.com

Prezentowane w katalogu wyróżniki jakości, właściwości oraz plony poszczególnych odmian zostały określone na podstawie oficjalnych wyników publikowanych w przez COBORU lub przez inne instytuty badawcze w Polsce i za granicą albo wewnętrzne dane zebrane przez naszą firmę. Należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania poszczególnych odmian opisanych w katalogu. Mogą się one różnić od rzeczywistych wyników z powodu zmiennych warunków atmosferycznych oraz innych czynników środowiskowych.