

FAO 250-260

AMISTI CS



ZIARNO



KISZONKA

S
P
I
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Włochy 2019, Czechy 2020

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów średnio
14,7



ziaren/rząd średnio
31,2



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

| stanowiska | SŁABE | ŚREDNIE | DOBRE |
|--------------|--------|---------|--------|
| roślin na ha | 80 000 | 85 000 | 90 000 |

DOPASOWANIE

bardzo dobre

dobre

średnie

CECHY AGRONOMICZNE




wczesny wigor

| | |
|---------------------------------|--|
| wczesny wigor | |
| tolerancja na sulfonilomoczniki | |
| stay green | |
| wyleganie korzeniowe | |
| wyleganie przed zbiorem | |
| głównia kukurydzy | |
| kolba: Fusarium moniliforme | |
| kolba: Fusarium graminearum | |



ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020-2021 r.

PLONY



Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach.