




KUKURYDZA 2024



SPIS ODMIAN

	NR STR.	FAO	ZALECANE UŻYTKOWANIE	TYP ZIARNA
CS WANTI	4	210-220		flint
ES FIELDGOLD	6	220	 	flint/dent
MAINSTONE (ESZ21101) NOWOŚĆ !	8	220-230		dent
ES MIDGARD	10	230		flint/dent
DENSITI CS	13	230-240	 	flint/dent
ANTIGONE	14	240	 	flint/dent
CS SOREMI	16	240	   	flint
DRAGONSTONE	18	240	 	dent
ROCKHAMPTON (LDZ22220) NOWOŚĆ !	20	240		flint/dent
GREYSTONE (ESZ21214) NOWOŚĆ !	21	240-250	 	flint
ARBORI CS	22	240-250		dent
KINGSTONE NOWOŚĆ !	24	240-250		dent
TOUTATI CS	26	240-250	 	dent
IMPAKTIT	28	250	 	flint/dent
AMISTI CS	30	250-260	 	flint/dent
BAOBI CS	32	250-260	 	flint
CS KISSMI	34	250-260	 	flint
MONLERI CS	36	250-260	 	flint/dent
ROLLINGSTONE (ESZ21315) NOWOŚĆ !	38	250-260	 	flint/dent
ES WINWAY	40	260	 	dent
OSTINATI CS	42	260		dent
KALKUTA (ESZ21302) NOWOŚĆ !	44	260		flint/dent
OVERSTONE (CSM21312) NOWOŚĆ !	45	270	 	flint/dent
POESI CS	46	270	 	flint/dent
WINTERSTONE (ESZ21306) NOWOŚĆ !	48	270		dent



ZIARNO



GRYS



KISZONKA



BIOGAZ



BIOETANOL

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU [TYS.]			CECHY AGRONOMICZNE							
STANOWISKA SŁABE	STANOWISKA ŚREDNIE	STANOWISKA DOBRE	WCZESNY WIGOR	TOLERANCJA NA SULFONYLOMOCZNIKI	STAY GREEN	WYLEGANIE KORZENIOWE	WYLEGANIE PRZED ZBIOREM	GŁOWNIA KUKURYDZY	KOLBA: FUSARIUM MONILIFORME	KOLBA: FUSARIUM GRAMINEARUM
75	85	95	7	8	6	9	9	9	8	9
75	80	85	9	8	7	8	8	6	8	8
75	85	90	7	8	8	7	6	8	7	8
70	75	80	7	8	8	7	8	9	9	9
80	85	90	8	8	8	8	8	7	8	7
80	85	90	8	8	9	9	8	8	7	8
80	85	90	8	8	8	8	8	8	8	8
70	75	80	9	8	7	8	9	7	8	8
80	80	85	9	8	8	7	9	7	8	8
80	85	93	7	8	8	7	7	6	7	7
75	80	85	7	8	7	9	9	8	9	8
75	80	85	7	8	8	8	9	8	8	8
80	85	90	7	7	7	8	9	8	8	9
85	87	90	7	8	8	8	7	7	8	7
80	85	90	8	9	8	8	9	8	9	8
75	85	95	8	7	8	9	9	8	8	8
75	82	90	9	7	9	8	8	8	8	8
75	85	95	7	7	7	8	8	8	8	7
90	90	90	7	8	7	7	8	6	7	7
70	75	75	8	7	8	8	9	9	9	9
75	80	85	7	8	7	9	9	8	8	8
75	80	80	8	8	7	8	9	9	7	8
85	85	90	7	8	7	7	7	9	8	8
75	85	95	9	6	8	8	7	9	9	8
75	80	80	7	8	7	8	7	7	7	8



ZIARNO

TYP ODMIANY

SC mieszaniec pojedynczy

REJESTRACJA

Litwa 2020, Niemcy, Włochy 2021

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów średnio
15,5




ziaren/rząd średnio
32.1



typ ziarna
FLINT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor




szybkie dosychanie





● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020-2021 r.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.



ZIARNO



BIOETANOL

S
P
I
O

TYP ODMIANY

SC mieszaniec pojedynczy

REJESTRACJA

Polska 2021

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
13,9ziaren/rząd średnio
30,8typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	75 000	80 000	85 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor




szybkie dosychanie

wczesny wigor		9
tolerancja na sulfonilomoczniki		8
stay green		7
wyleganie korzeniowe		8
wyleganie przed zbiorem		8
głównia kukurydzy		6
kolba: Fusarium moniliforme		8
kolba: Fusarium graminearum		8



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia porejestrowe, 2021 r.

PLONY




Plon (dt/ha) oraz % wzorca w lokalizacjach.



● ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2022 r.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz % wzorca w lokalizacjach.



SC mieszaniec pojedynczy

Polska 2022



rzędów średnio
16,2



ziaren/rząd średnio
26,7



typ ziarna
FLINT/DENT

stanowiska

SŁABE

ŚREDNIE

DOBRE

roślin na ha

70 000

75 000

80 000

DOPASOWANIE

● bardzo dobre

☒ dobre

● średnie

 stabe

szybkie dosychanie



zdrowotność

wczesny wigor

tolerancja na sulfonilomoczniki

stay green

wyleganie korzeniowe

wyleganie przed zbiorem


głównia kukurydzy

kolba: *Fusarium moniliforme*kolba: *Fusarium graminearum*



● ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe 2020-2021.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.





FAO 230-240 DENSITI CS



KISZONKA



BIOGAZ

* Wydajność
produkcji
biogazu
[m³/ha]

OPIS

TYP ODMIANY

SC mieszaniec pojedynczy

REJESTRACJA

Włochy 2019

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów średnio
15,5



ziaren/rząd średnio
35,0



typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	80 000	85 000	90 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor

wczesny wigor	
tolerancja na sulfonilomoczniki	
stay green	
wyleganie korzeniowe	
wyleganie przed zbiorem	
głównia kukurydzy	
kolba: Fusarium moniliforme	
kolba: Fusarium graminearum	



ZIARNO



KISZONKA

S
P
I
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Czechy 2022, Włochy 2023

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
13,6ziaren/rząd średnio
28,1typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	80 000	85 000	90 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE




wczesny wigor

wczesny wigor		8
tolerancja na sulfonilomoczniki		8
stay green		9
wyleganie korzeniowe		9
wyleganie przed zbiorem		8
głównia kukurydzy		8
kolba: Fusarium moniliforme		7
kolba: Fusarium graminearum		8



ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2021 r.

PLONY



Plon świeżej masy i % zawartości suchej masy w lokalizacjach.



* Wydajność produkcji biogazu [m³/ha]

SC mieszaniec pojedynczy

Włochy 2021



rzędów średnio
15.3




ziaren/rząd średnio
30,6



typ ziarna
FLINT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE




zdrowotność





● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2022 r.

PLONY



Plon ogólny świeżej masy w rejonach (% wzorca / dt/ha).



ZIARNO



BIOETANOL

S
I
P
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy


REJESTRACJA

Austria 2022, Słowacja 2022

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
15,4ziaren/rząd średnio
27,6typ ziarna
DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor



zdrowotność




szybkie dosychanie





ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2021 r.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz % wzorca w lokalizacjach.

FAO 240

ROCKHAMPTON (LDZ22220)



ZIARNO

NOWOŚĆ !

S
P
I
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

spodziewana – Austria 2024, Włochy 2024

MORFOLOGIA KOLBY


 rzędów średnio
14,0

 ziaren/rząd średnio
30,0

 typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	80 000	80 000	85 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor



zdrowotność



szybkie dosychanie

wczesny wigor		9
tolerancja na sulfonilomoczniki		8
stay green		8
wyleganie korzeniowe		7
wyleganie przed zbiorem		9
głównia kukurydzy		7
kolba: Fusarium moniliforme		8
kolba: Fusarium graminearum		8



FAO 240-250

GREYSTONE (ESZ21214)



KISZONKA



BIOGAZ

* Wydajność
produkcji
biogazu
[m³/ha]**NOWOŚĆ !**S
P
I
S

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Francja 2023

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
17,0ziaren/rząd średnio
26,0typ ziarna
FLINT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	80 000	85 000	93 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe


CECHY AGRONOMICZNE

wczesny wigor	
tolerancja na sulfonilomoczniki	
stay green	
wyleganie korzeniowe	
wyleganie przed zbiorem	
głównia kukurydzy	
kolba: Fusarium moniliforme	
kolba: Fusarium graminearum	



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020-2021 r.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.



ZIARNO

NOWOŚĆ !

TYP ODMIANY

SC mieszaniec pojedynczy

REJESTRACJA

Austria 2023, Francja 2023, spodziewana – Polska 2024

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów średnio
15,0




ziaren/rząd średnio
34,0



typ ziarna
DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU



CECHY AGRONOMICZNE




szybkie dosychanie





● ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2022 r.

PLONY




Plon (dt/ha) oraz % wzorca w lokalizacjach.



ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2016 r.

PLONY




Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2022 r.

PLONY



Plon ogólny suchej masy w rejonach (% wzorca / dt/ha).



ZIARNO



KISZONKA

S
P
I
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Włochy 2019, Czechy 2020

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
14,7ziaren/rząd średnio
31,2typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	80 000	85 000	90 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE




wczesny wigor

wczesny wigor		8
tolerancja na sulfonilomoczniki		9
stay green		8
wyleganie korzeniowe		8
wyleganie przed zbiorem		9
głównia kukurydzy		8
kolba: Fusarium moniliforme		9
kolba: Fusarium graminearum		8



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020-2021 r.

PLONY




Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach.



ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020 r.

PLONY



Plon ogólny świeżej masy w rejonach (% wzorca / dt/ha).




* Wydajność
produkcji
biogazu
[m³/ha]



ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020-2021 r.

PLONY




Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach.



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2016 r.

PLONY



Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach.

ROLLINGSTONE (ESZ21315)



NOWOŚĆ!

Słowacja 2023



typ ziarna
FLINT/DENT

90 000

 stable

odporność na susze

wczesny wigor

7

tolerancja na sulfonilomoczniki

8

stay green

7

wyleganie korzeniowe

7

wyleganie przed zbiorem

8

głównia kukurydzy

6

kolba: *Fusarium moniliforme*

7


kolba: *Fusarium graminearum*

7



ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2022 r.

PLONY




Plon ogólny suchej masy w rejonach (% wzorca / dt/ha).



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia porejestrowe, 2021 r.

PLONY




Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2020 r.

PLONY



Plon (dt/ha) oraz wilgotność ziarna (%H₂O) w lokalizacjach.



FAO 270

OVERSTONE (CSM21312)



KISZONKA



BIOGAZ

* Wydajność
produkcji
biogazu
[m³/ha]**NOWOŚĆ !**S
P
I
S

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Francja 2023

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
17,0ziaren/rząd średnio
28,0typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	85 000	85 000	90 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



zdrowotność

wczesny wigor	
tolerancja na sulfonilomoczniki	
stay green	
wyleganie korzeniowe	
wyleganie przed zbiorem	
głównia kukurydzy	
kolba: Fusarium moniliforme	
kolba: Fusarium graminearum	



KISZONKA



BIOGAZ

S
I
P
O

TYP ODMIANY

TC mieszaniec trójliniowy

REJESTRACJA

Niemcy 2017, Włochy 2017, Czechy 2018

MORFOLOGIA KOLBY

rzędów średnio
14,8ziaren/rząd średnio
33,1typ ziarna
FLINT/DENT

DOPASOWANIE DO STANOWISKA I NORMA WYSIEWU

stanowiska	SŁABE	ŚREDNIE	DOBRE
roślin na ha	75 000	85 000	95 000

DOPASOWANIE

- bardzo dobre
- dobre
- średnie
- słabe

CECHY AGRONOMICZNE



wczesny wigor




zdrowotność

wczesny wigor		9
tolerancja na sulfonilomoczniki		6
stay green		8
wyleganie korzeniowe		8
wyleganie przed zbiorem		7
głównia kukurydzy		9
kolba: Fusarium moniliforme		9
kolba: Fusarium graminearum		8



● ŹRÓDŁO • COBORU/PZPK. Doświadczenia rozpoznawcze, 2018 r.

PLONY



Plon ogólny świeżej masy (% wzorca / dt/ha) w lokalizacjach.

WINTERSTONE (ESZ21306)



TYP ODMIANY

SC mieszaniec pojedynczy

REJESTRACJA

spodziewana – Polska 2024

MORFOLOGIA KOLBY



rzędów średnio
15,0



ziaren/rząd średnio
34,0



typ ziarna
DENT

stanowiska

SŁABE

ŚREDNIE

DOBRE

roślin na ha

75 000

80 000

80 000

DOPASOWANIE

● bardzo dobre

 dobre

● średnie

 stabe

zdrowotność

wczesny wigor

7

tolerancja na sulfonilomoczniki

8

stay green

7

wyleganie korzeniowe

8

wyleganie przed zbiorem

7

głównia kukurydzy

7

kolba: *Fusarium moniliforme*

7


kolba: *Fusarium graminearum*

8



ŹRÓDŁO • COBORU. Doświadczenia rejestrowe, 2022 r.

PLONY




Plon (dt/ha) oraz % wzorca w lokalizacjach.



caussadesemencespro



caussadesemencespro



PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI

1	Jan Borczykowski	tel.: +48 690 006 642	jan.borczykowski@caussadesemencespro.com
2	Kamil Tysza	tel.: +48 669 333 050	kamil.tysza@caussadesemencespro.com
3	Jadwiga Aleksandrowicz	tel.: +48 602 414 500	jadwiga.aleksandrowicz@caussadesemencespro.com
4	Tomasz Kluziak	tel.: +48 885 999 020	tomasz.kluziak@caussadesemencespro.com

KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Sławomir Markiewicz	tel.: +48 661 999 571	slawomir.markiewicz@caussadesemencespro.com
---------------------	-----------------------	---



DYSTRYBUTOR